

副作用症状一覧 CTCAE Version5.0

	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4
発熱	38.0～39.0℃	> 39.0～40.0℃	> 40.0℃が≦24時間持続	> 40.0℃が> 24時間持続
下痢	・ベースラインと比べて<4回/日の排便回数増加 ・ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量が軽度増加	・ベースラインと比べて4～6回/日の排便回数増加 ・ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の中等度増加 ・身の回り以外の日常生活動作の制限	・ベースラインと比べて7回以上/日の排便回数増加 ・入院を要する ・ベースラインと比べて人工肛門からの排泄量の高度増加 ・身の回りの日常生活動作の制限	・生命を脅かす ・緊急処置を要する
口内炎	症状がない、または軽度の症状；治療を要さない	経口摂取に支障がない中等度の疼痛または潰瘍；食事の変更を要する	高度の疼痛；経口摂取に支障がある	生命を脅かす；緊急処置を要する
悪心	摂食習慣に影響のない食欲低下	顕著な体重減少、脱水または栄養失調を伴わない経口摂取量の減少	カロリーや水分の経口摂取が不十分；経管栄養/TPN/入院を要する	—
食欲不振	摂食習慣の変化を伴わない食欲低下	顕著な体重減少や栄養失調を伴わない摂取量の変化；経口栄養剤による補充を要する	顕著な体重減少または栄養失調を伴う（例：カロリーや水分の経口摂取が不十分）；静脈内輸液/経管栄養/TPNを要する	生命を脅かす；緊急処置を要する
嘔吐	治療を要さない	外来での静脈内輸液を要する；内科的治療を要する	経管栄養/TPN/入院を要する	生命を脅かす
呼吸困難 （空咳 息切れ）	中等度の労作に伴う息切れ	極めて軽度の労作に伴う息切れ；身の回り以外の日常生活動作の制限	安静時の息切れ；身の回りの日常生活動作の制限	生命を脅かす；緊急処置を要する
手掌・足底発赤知覚不全症候群 （発疹 皮膚症状）	疼痛を伴わない軽微な皮膚の変化または皮膚炎（例：紅斑、浮腫、角質増殖症）	疼痛を伴う皮膚の変化（例：角層剥離、水疱、出血、亀裂、浮腫、角質増殖症）；身の回り以外の日常生活動作の制限	疼痛を伴う高度の皮膚の変化（例：角層剥離、水疱、出血、亀裂、浮腫、角質増殖症）；身の回りの日常生活動作の制限	—
末梢性感覚ニューロパチー （しびれ ふらつき）	症状がない；深部腱反射の低下または知覚異常（例：手足のしびれ・違和感）	中等度の症状；身の回り以外の日常生活動作の制限（例：手足の感覚（触覚、温痛覚、振動覚、位置覚）が鈍くなる）	高度の症状；身の回りの日常生活動作の制限（例：手足の感覚（触覚、温痛覚、振動覚、位置覚）がなくなる）	生命を脅かす；緊急処置を要する
眼の症状（流涙）	治療を要さない	症状あり；中等度の視力低下を伴う（最高矯正視力0.5以上または既知のベースラインから3段階以下の視力低下）	顕著な視力低下（最高矯正視力0.5未満、0.1を超える、または既知のベースラインから3段階を超える視力低下）	罹患眼の最高矯正視力0.1以下